

## Herbizidempfehlung - breite Mischverunkrautung

### Einsatz von Clomazone nicht möglich

Breite Mischverunkrautung + Kerbel,  
Klatschmohn, Klettenlabkraut,  
Storchschnabel, Kornblume,  
Wilde Möhre, Hundspetersilie,  
Stiefmütterchen, Hirtentäschel

**Katamaran Plus 1,5 l/ha  
+ Tanaris 0,5 l/ha  
+ Runway 0,2 l/ha NA<sub>k</sub>**  
(AGRAVIS KATARU Pack)

Breite Mischverunkrautung +  
Klettenlabkraut

**Fuego Top 2,0 l/ha VA - NA<sub>k</sub>**


Breite Mischverunkrautung +  
Klettenlabkraut, Storchschnabel,  
Hirtentäschel

**Butisan Gold 2,5 l/ha VA - NA<sub>k</sub>**

#### Mögliche Spätverunkrautung

Rauke	Fox* 0,8 l/ha
Kamille, Kornblume	Runway 0,2 l/ha
Klettenlabkraut, Storchschnabel	Belkar 0,25 l/ha (Herbst) oder Korvetto 1,0 l/ha (Frühjahr)
Gräser	Kerb Flo 1,875 l/ha (Spätherbst)

\* **Anwendungsbedingungen für Fox beachten** (trockenes Blatt, mindestens 5 Tage Abstand zu anderen Pflanzenschutz-Maßnahmen, Tankmischung nur mit Effigo/Runway möglich)



## Herbizidempfehlung - breite Mischverunkrautung

inkl. Problemunkräuter (Hirtentäschel, Rauke)

### Einsatz von Clomazone möglich (Auflagen beachten)

inkl. Raukearten, Hirtentäschel,  
Hellerkraut, Klettenlabkraut

Nachlage nach Bedarf; z.B.

Abstand von 20 m  
zu Ortschaften, ....


**Gamit 36 AMT**  
0,25 l/ha (VA)

**Fuego Top 1,5 l/ha**

inkl. Raukearten, Hirtentäschel,  
Hellerkraut, Kamille, Klettenlabkraut, Storchschnabel

Abstand von 50 m  
zu Ortschaften, ....

**Colzor Trio**  
3,0-4,0 l/ha (VA)  
mittlere bis schwere Böden  
(> 3 % Humus: 4,0 l/ha)



## Herbizidempfehlung – Anwendungsempfehlung „LaDiva bzw. Belkar“

(Anwendung als Spritzfolge im Nachauflauf)

- Nachauflauf **ab BBCH 12** (vorher Schäden möglich)
- Abstand zwischen Vor- und Nachlage mind. 14 Tage

### Wirkungsspektrum:

Breite Mischverunkrautung inkl. Kerbel, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Kamille, Storchschnabel, Kornblume, Stiefmütterchen, Hirtentäschel

Mögliche Vorlagen bei weiteren Problemunkräutern:


**Ackerfuchsschwanz, Windhalm, einj. Rispe, Trespe, Vogelmiere:**

**Fuego 1,5 l/ha VA - NA<sub>k</sub>**

**Wegrauke, Vogelmiere:**

**Gamit 36 AMT 0,25 l/ha (VA)**

(Clomazone-Auflagen beachten)



**LaDiva**  
0,25 l/ha

oder

**Belkar + Synero**  
0,25 l/ha + 0,25 l/ha

**Belkar**  
0,25 l/ha

Bitte beachten Sie beim Einsatz von LaDiva bzw. Belkar unbedingt die Informationen auf der Folie:  
**Herbizidempfehlung – Anwendungsempfehlung „LaDiva bzw. Belkar“**  
 (weitere Infos + Beispiel Spritzfolge Herbst)

## Herbizidempfehlung – Anwendungsempfehlung „LaDiva bzw. Belkar“

(weitere Infos + Beispiel Spritzfolge Herbst)

	Herstellerfreigabe für Mischungen und Spritzfolgen mit Belkar (+ Synero)				
	0,25 l/ha LaDiva (ab EC 12-14)	0,25 l Belkar + 0,25 l/ha Synero (ab EC 12-14)	0,25 l/ha Belkar (EC 16)	Einmalanwendung 0,5 l Belkar + 0,25 l/ha Synero (ab EC 16)	Spritzfolgen (Abstand mind. 7 Tage)
<b>Bordünger</b>	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Insektizide</b>	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Graminizide</b>					
-PHYTAVIS Varlega 0,8 l/ha	ja	ja	ja (1)	nein	ja
-Panarex 1,25 l/ha	ja	ja	ja (1)	nein	ja
-Focus Ultra 2,5 l + Dash 1,0 l/ha	ja	ja	ja (1)	nein	ja
-Select 0,5 l + Radiamix 1,0 l/ha	ja	ja	nein	nein	ja (2)
-VextaDim 240 EC 0,5 l + Vexzone 0,5 l/ha	ja	ja	nein	nein	ja (2)
-Fusilade Max	ja	nein	nein	nein	ja
-Agil-S, P. Nilam, T. Super, P. Dinagam	nein	nein	nein	nein	ja
<b>Fungizide / Wachstumsregler</b>					
-Architect 1,6 l/ha + Turbo 0,8 l/ha	ja(1)	nein	ja(1)	nein	ja
-Folicur 0,5-0,75 l/ha	ja(1)	nein	ja(1)	nein	ja
-Orius, max. 0,6 l/ha	ja(1)	nein	ja(1)	nein	ja
-Tilmor 0,75-1,0 l/ha	ja(1)	nein	ja(1)	nein	ja
-Toprex 0,35-0,5 l/ha	ja(1)	nein	ja(1)	nein	ja
-Carax, Caramba, Efilor	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Fox</b>	nein	nein	nein	nein	ja

### Infos zur Anwendung von LaDiva / Belkar:

- LaDiva und Belkar (mit 0,25 l/ha) sind ab dem Zweiblattstadium im Raps anzuwenden (frühere Anwendung: Kulturschäden möglich).
- Die empfohlene Anwendung erfolgt als Spritzfolge (BBCH 12 + BBCH 15/16; Abstand mind. 14 Tage).
- Mischbarkeit: siehe Tabelle
- Bei Anwendung von Belkar bzw. LaDiva dürfen **keine** Metconazol-haltigen Produkte im **gesamten** Herbst eingesetzt werden.

(1) Tankm. aus Graminizid und Fungizid/WR wird nicht empfohlen (2) Einsatz bis Ende September (max. eine Clethodim-Anwendung)

