




		Besonders geeignet für Fruchtfolgen mit							Saatzzeit-Empfehlung								Aussaatstärke			
CIRCONIUM-Mischungen	Zusammensetzung ¹	Mais	Getreide	Raps	Zuckerrüben	Körnerleguminosen	Kartoffeln	Jul			Aug			Sep			Okt		kg/ha	
								Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte		
Bodergesundheit / StickstofffixierungFruchtfolgen	CIRCONIUM Multicrop*	Phacelia, Rauhafer (Pratex), Leindotter, Ölrettich (Informer), Sorghum, Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Peluschke, Winterwicke	XX	XX	X	X		X												30 - 35
	CIRCONIUM Extra-Klee* 	Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Öllein, Phacelia, Ramtilkraut	XX	XX	XX	X														15 - 18
	CIRCONIUM Nitropro*	Bitterlupine, Sommerwicke, Alexandrinerklee, Phacelia, Populationsroggen	XX	XX	XX															70 - 80
Raps-Fruchtfolgen	CIRCONIUM Multitalent	Phacelia, Rauhafer (Pratex), Ramtilkraut, Öllein	XX	XX	XX															20 - 25
	CIRCONIUM Kreuzerfrei* 	Phacelia, Alexandrinerklee, Ramtilkraut, Öllein	XX	XX	XX	X														10 - 18
Mais-Getreide-Fruchtfolgen	CIRCONIUM Kornpro+N*	Ölrettich, (Informer / Mohikan), Gelbsenf (Albatros, Cover, Pirat), Sommerwicke	XX	XX																30
	CIRCONIUM Waterprotect	Winterraps, Winterrüben, Markstammkohl	XX	XX	X															10 - 15
Schnitt-nutzung	CIRCONIUM Klee gras*	Welsches Weidelgras (Melsprinter, Barmultra II, Lipsos), Inkarnatklee, Rotklee	XX	XX	X															30 - 40
Kartoffel-Fruchtfolgen	CIRCONIUM Solapro+N*	Ölrettich (Doublemax - multiresistent), Rauhafer (Pratex), Sommerwicke	X	X		X			XX											50 - 55

¹ Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt.
 Auch als Sommerzwischenfrucht geeignet*

* Besondere Eignung für Rote Gebiete (Leguminosen-Anteil)
 Fruchtfolgeeignung: xx = besonders gut geeignet
 x = gut geeignet