

Unser Leitfaden für Impfungen im Bereich Geflügel

Unterstützung durch Spezialprodukte von
MIRAVIT® und **DESINTEC®**



48 Stunden vor Impfung



Anwendung von **Virkon® H2O**

- Zur Desinfektion und pH-Wert Absenkung des Wassers
- **Dosierempfehlung:** max. 1 kg auf 1.000 l Wasser

Impfungen wie z.B. ND, IB, Gumboro, Nadelimpfung, etc.

Zum Zeitpunkt der Impfung ist ein Rückstand von Desinfektionswirkstoffen im Tränkesystem unbedingt zu vermeiden. Ein vorheriges Durchspülen der Leitung ist zu empfehlen.

Nach Verabreichung der Impfung



Anwendung von **MIRAVIT® VitaAqua Plus** 2 bis 3 Tage

- Unterstützung wichtiger Stoffwechselfunktionen durch die Zugabe ernährungsphysiologisch wichtiger Vitamine und Spurenelemente
- **Dosierempfehlung:** 1 l auf 1.000 l Wasser

Nach der Gabe von MIRAVIT® VitaAqua Plus



Anwendung von **Virkon® H2O** für einen weiteren Tag

- Zur Desinfektion und pH-Wert Absenkung des Wassers
- **Dosierempfehlung:** max. 1 kg auf 1.000 l Wasser

Zusatzhinweise:

Diese Informationen können lediglich als richtungsweisend und nicht als verbindlich betrachtet werden. Die Empfehlungen, Spezifikationen und Einschränkungen der Anlagenhersteller werden durch unsere Empfehlung nicht ersetzt. Die Angaben der Anlagen- und Einrichtungshersteller, insbesondere in Bezug auf Temperaturstabilität und Materialverträglichkeit sind verbindlich.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

AGRAVIS Nutztier GmbH
Industrieweg 110 . 48155 Münster
Hotline 0251 . 682-1188



MIRAVIT
Hält Ihre Tiere fit.